

BR0751D020

POLIGOLD FC ENGORDA

NÚCLEO PARA AVES

Indicação do produto:

Núcleo vitamínico, mineral, aminoácido, enzimático com aditivos para Frangos de corte na fase de crescimento.

Composição básica do produto: Fosfato Bicálcico, Carbonato de cálcio, Cloreto de sódio (Sal comum), Vitamina A, Vitamina D3, Vitamina E, Vitamina K3, Vitamina B1, Vitamina B2, Pantotenato de cálcio, Vitamina B6, Vitamina B12, Niacina, Ácido fólico, Biotina, Cloreto de colina, Iodato de Cálcio, Selenito de sódio, Sulfato de Cobre, Sulfato de Ferro, Sulfato de Manganês, Sulfato de Zinco, DL-Metionina, Aditivo enzimático, Halquinol, Salinomicina sódica, Dióxido de silício.

Eventuais Substitutivos: Não há.

Níveis de garantia (por kg do produto):

Sódio(mín).....	42,75	g	Biotina(mín).....	2,50	mg
Cálcio(mín).....	103,56	g	Colina(mín).....	3.262,50	mg
Cálcio(max).....	112,62	g	Ferro(mín).....	750,00	mg
Fósforo(mín).....	22,50	g	Cobre(mín).....	250,00	mg
Vitamina A(mín).....	225.000,00	U.I.	Manganês(mín).....	2.250,00	mg
Vitamina D3(mín).....	62.500,00	U.I.	Zinco(mín).....	2.125,00	mg
Vitamina E(mín).....	500,00	U.I.	Iodo(mín).....	37,50	mg
Vitamina K3(mín).....	62,50	mg	Selênio(mín).....	13,75	mg
Vitamina B1(mín).....	50,00	mg	Metionina(mín).....	29,40	g
Vitamina B2(mín).....	150,00	mg	Fitase.....	62.500,00	FYT
Ácido pantotênico(mín).....	300,00	mg	Halquinol.....	750,00	mg
Vitamina B6(mín).....	75,00	mg	Salinomicina.....	1.500,00	mg
Vitamina B12(mín).....	375,00	mcg	Flúor(max).....	225,00	mg
Ácido nicotínico(mín).....	875,00	mg			
Ácido fólico(mín).....	37,50	mg			

Modo de usar:

Frangos de corte na fase de crescimento: Adicionar 40 kg/ton de ração.

Avisos: Período de retirada: 5 dias antes do abate. Evitar que suínos tenham acesso a rações contendo salinomicina pelo menos sete dias antes e após terem recebido rações com tiamulina. Não administrar a galinhas poedeiras e frangos acima de 16 semanas de idade. Não aprovado para ser usado como "binders" para pellets. ESTE PRODUTO CONTÉM IONÓFOROS. A ingestão pode ser fatal. A sua utilização simultânea com certas substâncias medicamentosas pode ser contra-indicada. Incompatível com a tiamulina. Não administrar em cavalos, outros equídeos ou perus adultos.

Conservar em local seco, fresco e ventilado, ao abrigo da luz solar. Não armazenar o produto em contato direto com o solo.

Produto isento de registro no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.